

Alugastrin®

Przeciwrefluksowa zawieszina doustna
w saşetkach jednodawkowych 10 ml

MAX PROTECT

Ochrona przed refluksiem

- ▶ zgaga
- ▶ refluks
- ▶ niestrawnořć
- ▶ zgaga w ciąży

Skład

Woda oczyszczona, alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu, węglan wapnia, aromat, kwas poliakrylowy, propylu parahydroksybenzoesan sodu, metylu parahydroksybenzoesan sodu, sacharynian sodu.

Wskazania

ALUGASTRIN MAX PROTECT to wyrób medyczny, którego składniki: alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu i węglan wapnia, działają mechanicznie. Produkt wykazuje trzy synergiczne działania: blokowanie refluksu kwaśnego, zmniejszenie zgagi i ochrona błony śluzowej przełyku.

ALUGASTRIN MAX PROTECT wskazany jest w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: zgaga, zgaga w okresie ciąży, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, niestrawnořć, nocne objawy refluksu, kaszel, zapalenie krtani i gardła.

Sposób działania

ALUGASTRIN MAX PROTECT zawiera w składzie alginian sodu i węglany sodu, które wykazują fizyczny mechanizm działania. W kontakcie z kwaśnym pH żołądka, alginian sodu (naturalny polimer wyekstrahowany z brunatnych wodorostów) ulega żelowaniu, a węglany uwalniają dwutlenek węgla, który transportuje cząstki żeluz na powierzchnię treści żołądkowej, tworząc w ten sposób "tratwę". Dzięki temu następuje mechaniczne zablokowanie przedostawania się treści żołądkowej do przełyku. Ponadto obecnořć wodorowęglanu zmniejsza kwasowořć w żołądku. Dzięki powyższym właściwościom z jednoczesnym efektem bariery mechanicznej, produkt chroni błonę śluzową przełyku przed agresywnym działaniem kwasów. W rezultacie sprzyja to regeneracji i pomaga zapobiegać nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Odpowiednio dobrana formuła alginianu sodu i węglanów zapewni szybkie działanie.

Przyjmowanie i dawkowanie

Dorořli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 lub 2 saşetki po głównych posiłkach i przed snem. Wstrzasać przed użyciem.

Dzieci poniżej 12. roku życia: podawać wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Sposób przyjmowania: nalezy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Ostrzeżenia

Nie stosować produktu po upływie daty waŹności na opakowaniu i saşetkach. Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolnořci nerek. W przypadku nadwrażliwořci na składniki, nie stosować produktu. W przypadku wystąpienia działań niepoŹądanych, przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Produkt moŹe zmieniać wchłanianie niektórych doustnych leków. W przypadku przyjmowania leków, nalezy skontaktować się z lekarzem. W każdym przypadku nalezy uwzględnić dwugodzinny odstępu między przyjęciem produktu, a podaniem innego leku. JeŹeli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, nalezy skonsultować się z lekarzem. Produkt moŹe powodować wzdęcia. Stosowanie produktu zgodnie z instrukcją, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia refluksu. Wyrób medyczny zawiera sól w ilořci odpowiadającej około 100 mg (4,4 mmol) i wapń w ilořci odpowiadającej około 36 mg (0,9 mmol) w saşetce (10 ml). Nalezy skontaktować się z lekarzem, jeřli pacjent jest na diecie niskosodowej m.in. w niektórych przypadkach nadciřnienia, chorób serca, zaburzeń czynnořci nerek lub wątroby oraz w przypadku hiperkalcemii, kamicy nerkowej i nawracających kamieni nerkowych.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze 8°C - 25°C, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i Źródłami ciepła. Nie przechowywać w lodówce.



bez glutenu



bez laktozy



dostępne
opakowania:
10 x 10 ml
jednodawkowe
saşetki



Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD), Włochy

WYRÓB MEDYCZNY

URGO

Dystrybutor: URGO Sp. z o.o.,
Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

CE 0373

Data ostatniej rewizji: Lipiec 2022
(IFU_07/22r0_04/23)