

Alugastrin®

3 FORTE

Przeznaczenie:

Alugastrin® 3 FORTE to wyrób medyczny wskazany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, który poprzez mechaniczne działanie składników zawartych w produkcie, zapobiega przedostawianiu się kwasów żołądkowych w kierunku przełyku, obniża nadkwaśność żołądka, chroni błonę śluzową żołądka oraz przełyku przed drażniącym działaniem zgagi i zarzucanej kwaśnej treści żołądka.

Alginian sodu w połączeniu z węglanami, zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądka do przełyku poprzez mechanizm fizycznego działania.

W obecności kwasu żołądkowego, alginian zmienia stan fizyczny, staje się żelem, a węglan reaguje tworząc dwutlenek węgla. Ochronna warstwa żelu, utrzymująca się na powierzchni treści żołądka, zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądka i blokuje refluks w kierunku przełyku. Działanie ochronne błony śluzowej żołądka i przełyku następuje dzięki właściwościom mukoadhezyjnym (działanie powlekające błonę śluzową, w wyniku którego powstaje ochronna warstwa) Mucosave®, który jest ekstraktem z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej, łączy działanie mukoadhezyjne polisacharydów z ochronnym działaniem polifenoli z oliwy. Obecność węgla również przyczynia się do zmniejszenia nadmiernej nadkwaśności soku żołądkowego.

Wskazania:

Alugastrin® 3 FORTE jest wskazany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, w złągodzeniu objawów takich jak: zgaga, bóle żołądka, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, kaszel oraz zapalenie krtani i gardła.

Instrukcja podania/Jak podawać:

Należy poćknąć jedną tabletkę popijając ją wodą. Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki wieczorem przed snem. Druga tabletkę może być przyjęta w ciągu dnia, po posiłku, w przypadku takiej potrzeby lub konieczności. Maksymalne zalecane leczenie to 30 dni.

Środki ostrożności i ostrzeżenia:

- Produkt przeznaczony do stosowania doustnego.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników.
- Obecność sodu w składzie wymaga ostrożności podczas stosowania u pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca lub nerek.
- Biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań i danych dotyczących stosowania u kobiet w ciąży i u dzieci w wieku poniżej 12 lat, należy zasięgnąć porady lekarza przed użyciem.

- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Nie używać produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone lub naruszone.
- Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania.
- Należy korzystać z produktu zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań i danych podczas przyjmowania wielu produktów, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwa jest interakcja.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane:

Nie ma znanych lub przewidywalnych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tego produktu. Produkt był badany i nie powodował reakcji alergicznych ani innych działań niepożądanych.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników.

Składniki:

Mucosave® (ekstrakt z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka.

Wytwórca:

 NUTRILINEA S.r.l.
Via Gran Bretagna, 1 – 21013, Gallarate (VA) - Włochy

Dystrybutor:

URGO Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Tel.: +48 22 616 33 48
kontakt@pl.urgo.com

Opakowanie i masa netto:

Kartonik. Pudełko zawierające 30 tabletek (1,1 g każda)
Masa netto

33 g e

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, z dala od wilgoci. Termin ważności odnosi się do nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu.

Ostatnia aktualizacja:
Rev. 3 Wrzesień 2022

