

Infografika podsumowująca videocast

Kiedy warto włączyć probiotyk?



Włączenie wybranych szczepów probiotycznych zalecane jest:¹




już od 1 dnia leczenia we wszystkich schematach terapii eradykacyjnej,



jednocześnie ze stosowanymi lekami.

Tylko **3 szczepy probiotyczne** mają wpływ na uzyskanie:



WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Dedykowany do wsparcia każdej terapii eradykacyjnej



1 kapsułka dziennie



Nie wymaga przechowywania w lodówce.



Od 1 dnia leczenia.



Może być stosowany równocześnie z antybiotykiem³



Lactobacillus reuteri i *Saccharomyces boulardii* nie wykazują działania antagonistycznego wobec antybiotyków³

Prof. dr hab. n. med.
Anita Gąsiorowska



1. A. Gąsiorowska „Rozpoznawanie i leczenie zakażenia *Helicobacter pylori* – rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w pigułce, „Lekarz POZ, nr 5, pp. 251-256, 2023.
2. J. Daniluk, „Eradykacja *Helicobacter pylori* – siedem grzechów głównych” „Lekarz POZ, nr 6, pp. 411-420, 2021.
3. Raport z badania in vitro produktu HELICogastrin® przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.